



www.laudis.gr



Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

- Νέα δομή για υψηλή αποτελεσματικότητα και δύναμη δράσης
- Ελέγχει δύσκολα πλατύφυλλα ζιζάνια και ετήσια αγρωστώδη
- Παρέχει αποτελεσματική καταπολέμηση των ζιζανίων ενώ παραμένει ασφαλές για το καλαμπόκι
- Δουλεύει γρήγορα, ακόμη και κάτω από ξηρές συνθήκες
- Κατάλληλο για συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
- Περιλαμβάνει την υψηλή τεχνολογία αντιφυτοτοξικού παράγοντα της Bayer CropScience προστατεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την καλλιέργεια του καλαμπόκιου



Bayer CropScience

Η δύναμη να είσαι σκληρός με τα Ζιζάνια – Η ικανότητα να συμπεριφέρεσαι τρυφερά στο καλαμπόκι

Το **Laudis® OD** είναι ένα νέο εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού με τον μοναδικό συνδυασμό 2 χημικών ουσιών

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού με μεγάλο φάσμα δράσης σε πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια
 - Εξαιρετική δράση στα πλατύφυλλα
 - Επιπλέον, πολύ καλή δράση στα αγρωστώδη (σε σύγκριση με άλλες ουσίες της ίδιας ομάδας)
- Χωρίς προβλήματα στην εναλλαγή καλλιέργειας (αμειψισπορά)
- Τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες

Στοιχεία Χρήσης

- Ευέλικτο ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του παραγωγού
- Μπορεί να ακολουθήσει μετά από εφαρμογή με προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
- Συστήνεται σε μεταφυτρωτικούς ψεκασμούς για την πλήρη κάλυψη έναντι των πλατυφύλων ζιζανίων

Παράμετροι Εφαρμογής

- Ευρύ παράθυρο εφαρμογής (20-80 φύλλο καλαμοκιού)
- Ταχύτητα δράσης – Αντοχή στη βροχόπτωση
- Μεγάλη ευελιξία / δυνατότητα συνδυασμών

Μορφή (Formulation)

- Ελαιώδες εναιώρημα (OD) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση (δεν χρειάζεται την προσθήκη λαδιού) και βέλτιστη αποτελεσματικότητα

Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 225 κ.εκ./στρ)

Abutilon theophrasti (Αγριομαμπακιά),
Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα),
Polygonum aviculare (Πολυκόμπι)

Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 170 κ.εκ./στρ)

Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα)
Chenopodium album (Λουβουδιά)
Solanum nigrum (Αγριοτοματιά)
Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά)
Amaranthus retroflexus (Βλήτο τραχύ)
Amaranthus blitoides (Βλήτο πλαγιαστό)
Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)
Datura stramonium (Τάτουλας)
Polygonum lapathifolium (Λαπάτσα)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 225 κ.εκ./στρ)

Setaria viridis (Σετάρια πράσινη)
Setaria verticillata (Σετάρια σπονδυλωτή)
Sorghum halepense (Βέλιουρας)
Bilderdykia convolvulus (Αναρριχώμενο πολύγωνο)



ΑΓΡΙΟΤΟΜΑΤΙΑ
 ΒΛΗΤΟ ΤΡΑΧΥ
 ΚΟΥΡΟΥΔΙΑ
 ΜΟΧΡΙΤΣΑ

Δόση	170 - 225 κ.εκ./στρέμμα
Παράθυρο εφαρμογής	Μεταφυτρωτικά, 2-8 φύλλα της καλλιέργειας
Δράση	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Δρά διασυστηματικά μέσω της καλής επαφής με τη φυλλική επιφάνεια ▶ Δρα πολύ αποτελεσματικά σε νεαρά και καλά εγκατεστημένα ζιζάνια (το καλαμπόκι από το 2^ο φύλλο και μέχρι το 8^ο, τα αγρωστώδη ζιζάνια οπωσδήποτε πριν το στάδιο του αδελφώματος τα δε πλατύφυλλα από το 2^ο-8^ο φύλλο)
Ποσότητα νερού	30-40 λίτρα νερό/στρέμμα

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζεται πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας οδηγίες χρήσεως.



Bayer CropScience

Bayer Ελλάς ABEE
 Σωρού 18-20
 151 25 Μαρούσι
 Τηλ. 210 6166000
 Φαξ 210 6109100

www.bayercropscience.gr